

Säuglinge und Kleinkinder

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

Grundimmunisierung

- Tetanus
- Diphtherie
- Poliomyelitis
- Pertussis

Grundimmunisierung

- Hepatitis B
- Haemophilus influenzae Typ b
- Pneumokokken

- Rotaviren
Schluckimpfung ab einem Alter von 6 Wochen.
Von der Ständigen Impfkommission am RKI als Standard-Impfung noch nicht empfohlen.

- **2x** Masern, Mumps, Röteln
- **2x** Varizellen
- **1x** Meningokokken C
- **Influenza**
ab vollendetem 6. Lm.
Jährlich bei Risikopatienten

Vorschulalter (5 bis 6 Jahre)

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

Grundimmunisierung

- Tetanus
- Diphtherie
- Poliomyelitis
- Pertussis
- Hepatitis B

- **2x** Masern, Mumps, Röteln
- **2x** Varizellen
- **1x** Meningokokken C

- **Influenza**
Jährlich bei Risikopatienten

Empfohlene Auffrischimpfung:

- Tetanus
- Pertussis
- Diphtherie

Jugendliche im Alter von 9–17 Jahren

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

Grundimmunisierung

- Tetanus
- Diphtherie
- Poliomyelitis
- Pertussis
- Hepatitis B

- **2x** Masern, Mumps, Röteln
- **1x** Meningokokken C
- **Influenza**
Jährlich bei Risikopatienten

Empfohlene Impfungen:

- **Auffrischimpfung:**
Tetanus Pertussis
Diphtherie Poliomyelitis
- **Humane Papillomviren**
Für Mädchen 12–17 Jahre

- **2x** Varizellen
Bei Ungeimpften ohne Varizellen-Anamnese

Frauen im gebärfähigen Alter

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

- **Tetanus/Diphtherie**
Grundimmunisierung; Auffrischimpfung alle 10 Jahre
- **Pertussis**
Auffrischimpfung alle 10 Jahre
- **Poliomyelitis**
Grundimmunisierung und eine Auffrischimpfung; alle 10 Jahre auffrischen (wenn indiziert)

- **Röteln**
Ungeimpfte Frauen oder Frauen mit unklarem Impfstatus (zweimalige Impfung). Einmalig geimpfte Frauen (einmalige Impfung)
- **Varizellen**
Bei negativer Varizellen-Serologie

- **Influenza**
Jährlich bei Risikopatientinnen
Alle Schwangeren ab 2. Trimenon, bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens ab 1. Trimenon

Erwachsene

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

- **Tetanus/Diphtherie**
Grundimmunisierung; Auffrischimpfung alle 10 Jahre
- **Pertussis**
Einmalig mit der nächsten Td-Impfung, bei entspr. Indikation auch als Tdap-IPV oder alle 10 Jahre (wenn indiziert)
- **Poliomyelitis**
Grundimmunisierung und eine Auffrischimpfung; alle 10 Jahre auffrischen (wenn indiziert)

- **Masern**
Alle nach 1970 geborenen Pers. ≥18 Jahre, die ungeimpft bzw. in der Kindheit nur einmal geimpft wurden oder einen unklaren Impfstatus haben
Einmalige Impfung, vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff

Zusätzlich für Erwachsene ab 60 Jahre sowie Risikogruppen:

- **Pneumokokken-Erkrankungen**
Einmalig, Wiederimpfung frühestens alle 5 Jahre bei bestimmten Risikopatienten
- **Influenza**
Jedes Jahr aktualisieren

Praxispersonal

Erkrankungen, gegen die geimpft sein sollte:

- **Tetanus/Diphtherie**
Grundimmunisierung; Auffrischimpfung alle 10 Jahre
- **Pertussis**
Auffrischimpfung alle 10 Jahre
- **Poliomyelitis**
Grundimmunisierung und eine Auffrischimpfung; alle 10 Jahre auffrischen (wenn indiziert)

- **Influenza**
Jedes Jahr aktualisieren
- **Hepatitis B**
Grundimmunisierung mit Anti-HBs-Kontrolle, Auffrischimpfung alle 10 Jahre
- **Hepatitis A**
Grundimmunisierung (wenn indiziert)

- **Masern, Mumps, Röteln**
Ungeimpftes bzw. empfängliches Personal (wenn indiziert)
- **Varizellen**
Seronegatives Personal, insbesondere in der Pädiatrie, Onkologie, Gynäkologie/Geburts-hilfe, Intensivmedizin und in der Betreuung von Immundefizienten